



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

## Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2020.године



*Бања Лука  
Новембар, 2020. године*



## НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ОКТОБРУ

Октобар 2020. на подручју Републике Српске био је топао и промјенљив.

\*

Током октобра падавине су забиљежене на цијелом простору Српске.

\*


Агрометеоролошке прилике током већег дијела октобра су биле неповољне због честе и обилне кише

октобар 2020	Температуре ваздуха				Количина падавина		Температура земљишта на 5 cm		Температура земљишта на 20 cm		Влажност ваздуха %		Инсолација
	Макс.	Мин.	Сред.	Мин. 5cm	R mm	BCcm	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	h
Бања Лука	29.3	1.0	12.8	-0.2	172.7	-	22.9	6.5	19.3	10.0	98	31	183.6
Приједор	27.7	2.4	12.3	2.4	222.2	-	19.4	9.4	18.7	11.7	95	65	132.2
Србац	29.2	1.2	12.3	-	152.4	-	-	-	-	-	100	63	-
Бијељина	30.8	0.0	12.9	-0.3	59.5	-	22.2	7.8	19.0	11.0	95	61	137.7
Соколац	23.0	-5.8	8.3	-6.6	93.2	-	18.0	3.5	16.0	7.1	96	29	179.2
Добој	30.5	1.4	12.6	0.4	99.3	-	25.4	7.0	20.4	11.6	98	34	149.6
Требиње	26.0	6.5	14.9	5.0	148.8	-	-	-	-	-	98	40	-
Нови Град	28.1	3.9	12.4	4.0	200.9	-	-	-	-	-	95	40	-
Чемерно	18.8	-0.6	8.2	-	166.8	-	-	-	-	-	100	28	142.8
Вишеград	29.6	2.6	11.4	1.8	70.1	-	-	-	-	-	96	69	-
Мркоњић Град	24.0	0.8	10.9	-1.4	146.7	-	20.0	6.0	17.2	9.8	95	27	139.3

Табела 1 - Преглед метеоролошких података за најважније станице за октобар 2020. године



## ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У ОКТОБРУ




- ▶ Средња мјесечна температура ваздуха кретала се од 8,2 на Чемерно; 8,3 Сокоцу; 8,4 у Хан Пијесаку и Калиновику до 14,9 у Требињу. Одступање средње температуре у односу на вишегодишњи просјек износила је од +1,0 у Новом Граду до - 0,5°C у Билећи.
- ▶ Температуре ваздуха током већег дијела мјесеца су биле у оквиру вишегодишњег просјека, осим почетком, средином и у већини дана треће декада, кад су биле изнад просјека.
- ▶ Током појединих дана у октобру само је у вишим планинским предјелима забиљежен слаб до умјерен мраз.



## ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У ОКТОБРУ



- ▶ Минимална температура ваздуха у већини крајева забиљежена је (19, 20 и 21. октобра), у вишим предјелима кретала се од -6 до -1 (Соколац, Калиновик, Хан Пијесак и Чемерно), а у нижим предјелима износила је од 1 до 6°C.






## ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У ОКТОБРУ

- ▶ Највише дневне температуре у већини мјеста забиљежене су у првој половини прве и почетком треће декаде (3,4,5 и 23.октобра), а максималне су измјерене у Бијељини и Зворнику 31; Добоју, Вишеграду и Рудом 30; Бањој Луци, Градишци и Србцу 29, док су у планинским предјелима имале вриједности између 19 и 23°C.






## ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У ОКТОБРУ

- ▶ Инсолација у октобру имала је уједначене вриједности на свим станицама мјерења, нешто мало мању осунчаност имала је мјерна станица Приједор.




Слика 4 - Инсолација (h) за октобар 2020.године



## ПАДАВИНЕ

МЕСЕЧНА КОЛИЧИНА ПАДАВИНА ЗА ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ



► Током октобра падавине су забиљежене на цијелом простору Српске. Интензивније и обилније падавине регистроване су у другој декади октобра, нарочито на западу Српске и у Херцеговини. Нешто дужи период без падавина био је од 19 до 25 октобра.


► Захваљујући доспјелим падавинама у десетом мјесецу значајно су се поправиле залихе влаге како у површинском, тако и у дубљим слојевима земљишта и водо-физичко стање обрадивог земљишта. Тако да се припрема парцела и сјетва озимих култура одвијала беза већих проблема.

► Повољна температура и влажност земљишта довела је да посијани озими усјеви имају добре услове за брже и уједначено ницање.



## ПАДАВИНЕ

- ▶ Највише воденог талога у октобру измјерено је у Приједору, 222; Мраковици 219; Новом Граду 201; Рибнику 196; Билећи 187; Дринићу 176; Бањој Луци 173; Невесињу 170; Чемерну 168, док је најмање кише пало у Бијељини 59 l/m<sup>2</sup>.







## АКТИВНОСТИ ИНСЕКТА



Слика 6- лисне ваши пшенице

- ▶ Током октобра владали су повољни услови за појаву инсеката на ратаским културама репичина лисна оса-гусјеница прави штете на листовима (голобрст), затим лисне ваши и цикаде у усјевима озиме пшенице и јечма.
- ▶ Поред ових штеточина, штете у усјевима пшенице и јечма праве глодари који се хране посијаним и клијалим сјеменом, а велика оштећења праве и у луцериштима.



## ПОЉОПРИВРЕДНИ РАДОВИ

- ▶ Агрометеоролошке прилике током већег дијела октобра су биле неповољне због честе и обилне кише, али је било сувих и сунчаних дана који су омогућили да се обаве радови у пољу, као што су: берба кукуруза, грожђа, поврћа, воћа и обрада земљишта за јесењу сјетву и други актуелни пољопривредни радови у десетом мјесецу.





# Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2020.

► *Израдили:*

*Дејан Супић, руководилац Одсјека за агрометеорологију*

*Инес Ђурић, виши стручни сарадник за агрометеорологију*