



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА  
ИНФОРМАЦИЈА

## Преглед стања за период 17.03.–23.03.2025. године

---

Понедјељак је обиљежило облачно са кишом и пљусковима, а у ноћи на уторак падао је слаб снијег и у нижим крајевима. У вишим предјелима дошло је до формирања снијежног покривача.

Од уторка до суботе преовладало је сунчано уз малу облачност, а у јутарњим часовима регистрован је мраз умјереног до јаког интензитета. Током суботе преовладало је облачно са slabом до умјерном кишом праћена умјереним до јаким јужним вјетром.




Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од -12 до 2, у нижим од -7 до 6 на југу до 10, док се максимална дневна кретала у интервалу од -4 до 13 у вишим крајевима, у низинама од 7 до 21<sup>0</sup>С.

Температуре земљишта у сетвеном слоју и у зони корена озимих жита и крмних легуминоза


су у порасту што ће повољно утицати на њихов развој.

Топлије време од уобичајеног, које траје већ десетак дана, довело је до цвјетање најранијих воћних врста и сорти, као што је бресква, кајсија и ране сорте шљиве.

При том постоји опасност од позних зимских и раних прољећних мразева који се у нашем климатском подручју, уобичајено јављају до половине априла и могу причинити извјесне штете на процвјеталом воћу.



Залихе зимске влаге у већини производних подручја има, осим у Семберији гдје су потребне веће количине падавина. Доспјеле мартовске падавине наквасиле су површински слој земљишта и омогућиле да се растворе додата хранива и донекле поправиле стање за предстојећу рану сјетву. Озима жита се налазе у добром стању, као и презимљујуће воћне културе и винова лоза. Ипак, за даљи раст и развој усјева, као и за сејтву нових, неопходне су нове, значајније кише.





Током протеклих дана агрометеоролошки услови су погодовали појави симптома биљних болести. На усјеву јечма, примијећени су симптоми мрежасте пјегавости листа јечма, а на усјевима пшенице присутни су симптоми сиве пјегавости листа пшенице.

Од средине седмице пораст дневних температура ваздуха довео је до појаве првих јединки биљних ваши на усјевима пшенице. Код воћарских култура у засадима крушке са порастом температуре ваздуха дошло је до интензивног полагања јаја крушкине буге.

Што се тиче биљних болести, код нектарине и брескве које су у фазама бубрења пупољака и у влажним условима може доћи до остварења инфекције гљивом проузроковачем коврцавости листа брескве. Са порастом температура ваздуха прве падавине могу створити повољне услове за инфекцију овог патогена. Високе дневне температуре у претходном периоду довеле су до излазка обичне репине пипе. У току је и насељавање одраслих јединки житне пијавице на усјеве озимих стрнина и почетак полагања јаја.



Коврцавост листа брескве

## (период: од 24.03. 2024. до 30.03.2025.)

Према прогнози РХМЗ-а овај седмодневни период обиљежиће претежно до потпуно облачно са умјерном до јаком кишом, локално се очекују обилније падавине, док се у вишим предјелима у петак предвиђа сусњежица и снијег.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износиће од 4 до 7, у нижим од 7 до 10, на југу до 12, док ће се максимална дневна кретати у интервалу од 11 до 16 у вишим крајевима, у низинама од 10 до 22<sup>0</sup>С.

Током већег дијела седмице временске прилике неће одговарати за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном.